

РЕЦЕНЗИЯ

На клинические рекомендации «Нейроаксиальные методы обезболивания родов»

Клинические рекомендации «Нейроаксиальные методы обезболивания родов» посвящены одной из актуальных проблем акушерской анестезиологии – обезболиванию родов. аналгезии. Нейроаксиальные методы (эпидуральная, спинальная и комбинированная спинально-эпидуральная) благодаря современным местным анестетикам, техническому оснащению и мониторингу состояния матери и плода являются безопасной и эффективной технологией обезболивания родов.

Представленные клинические рекомендации соответствуют требованиям Министерства здравоохранения РФ с учетом того, что представлена технология проведения нейроаксиальной аналгезии, а не нозологическая единица.

Уровни достоверности и убедительности доказательств соответствуют требованиям, указаны как в тексте рекомендаций, так и в разделе «Критерии качества». В клинические рекомендации включены только рекомендации высокого уровня достоверности и убедительности.

Критерии качества медицинской помощи при профилактике ВТЭО в акушерстве непротиворечат приказу МЗ РФ №203н от 10.05.2017 г. «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» и могут быть реализованы в ЛПУ любого уровня. Критерии качества основаны на рекомендациях только высокого уровня достоверности и убедительности, не вызывающих сомнения. Достижение указанных критериев качества проведения нейроаксиальной аналгезии родов достаточно полно отражено в представленных алгоритмах.

Представленные алгоритмы соответствуют предложенным критериям качества оказания медицинской помощи и могут быть реализованы в ЛПУ любого уровня. Указанные лекарственные препараты входят в перечень ЖНВЛП.

Рецензент:

профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии

ФГАОУ ВО Первый МГМУ

им. И.М.Сеченова Минздрава России

(Сеченовский Университет)

доктор медицинских наук



А.М.Овечкин