

РЕЦЕНЗИЯ

на клинические рекомендации

«Коррекция артериальной гипотонии при нейроаксиальной анестезии во время операции кесарево сечение»

Соответствие клинических рекомендаций текущим требованиям МЗ РФ.

Клинические рекомендации посвящены одной из актуальных тем современной акушерской анестезиологии – артериальной гипотонии при проведении нейроаксиальной анестезии при операции кесарево сечение. По оформлению представленные клинические рекомендации в целом соответствуют требованиям МЗ РФ.

Проверка уровней достоверности и убедительности доказательств.

Указанные авторами уровни достоверности и убедительности доказательств соответствуют требованиям и современным руководствам.

Анализ оценки критериев качества с позиций:

- а) Выполнимости в ЛПУ. Все приведенные критерии качества выполнимы в ЛПУ разного уровня.
- б) Доказательной медицины. Все критерии качества обоснованы уровнями достоверности и убедительности доказательств.
- в) Расшифровки в блок-схемах. Указанные критерии качества представлены в блок-схемах.

Анализ блок-схем с позиций:

- а) Соответствия критериям качества. Представленные блок-схемы соответствуют указанным критериям качества.

б) Реализации в ЛПУ. Блок-схемы представленные в клинических рекомендациях могут быть реализованы в ЛПУ различного уровня.

Соответствие критериев качества указанным уровням оказания помощи.

Указанные критерии качества могут быть реализованы на описанных уровнях оказания медицинской помощи.

Заключение рецензента:

Представленные для рецензии Клинические рекомендации актуальны и крайне необходимы для практического здравоохранения. Принципиальных замечаний нет. В качестве дополнений, полагаю, целесообразно указать на возможность инвазивного мониторинга АД в случаях высокого риска и сформулировать показания к нему. Было бы полезно обратить внимание читателей на крайне высокий риск артериальной гипотонии у беременных с аортальным стенозом. Возможно, эту сопутствующую патологию стоило бы рассмотреть в отдельном разделе.

Несмотря на указанные непринципиальные предложения, клинические рекомендации «Коррекция артериальной гипотонии при нейроаксиальной анестезии во время операции кесарево сечение» могут быть представлены для утверждения на президиум ФАР.

Рецензент: д.м.н.

заведующий отделением
анестезии и реанимации 2
ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ



Кричевский Л.А.